

أسئلة وأجوبة: الأطفال ولقاحات كوفيد-19

لدى العديد من أولياء الأمور أسئلة حول لقاحات كوفيد-19، المتوفرة الآن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عامًا أو أكثر. فيما يلي إجابات لبعض الأسئلة الشائعة:

س: كيف أعرف أن لقاح كوفيد-19 آمن لطفلي؟

ج: أظهرت التجارب السريرية التي أجريت على عشرات الآلاف من المشاركين أمان وسلامة وفعالية لقاح كوفيد-19 للبالغين والبالغين الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر، ووافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على ترخيص الاستخدام الطارئ بناءً على تلك التجارب المكثفة. وقد حصل ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة على لقاحات كوفيد-19، مع استمرار مراقبة مكثفة للأمان والسلامة.

س: متى سيكون لقاح كوفيد-19 متاحًا للأطفال الأصغر سنًا؟

ج: لا تزال التجارب السريرية تجري حاليًا فيما يتعلق بالأطفال بدءًا من سن ستة أشهر. نأمل أن تتوفر لقاحات كوفيد-19 للأطفال دون سن 12 عامًا في الأشهر المقبلة، ربما في وقت مبكر مثل خريف 2021.

س: هل سيسبب لقاح كوفيد-19 التهاب عضلة القلب؟

ج: أصيب عدد قليل من المراهقين والشباب بحالات خفيفة من التهاب عضلة القلب، أو التهاب القلب، بعد الحصول على لقاح كوفيد-19. نادرًا ما أدى ذلك إلى دخول المستشفى.

- يبدو أن هذا عرض جانبي نادر للغاية يؤثر في الغالب على الذكور بعد الجرعة الثانية من لقاحي فايزر ومودرنا. تحدث هذه الحالات عادة في غضون 4 أيام بعد التطعيم.
- في حين أن احتمالية الإصابة بالتهاب عضلة القلب أمر مثير للقلق، إلا أنه يمكن علاجها بسهولة باستخدام الأدوية المضادة للالتهابات.
- تفوق المخاطر الناجمة عن الإصابة بكوفيد-19 خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، لذلك يواصل مركز السيطرة على الأمراض والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال التوصية بلقاح كوفيد-19 لأي شخص يبلغ من العمر 12 عامًا أو أكبر.
- من الموقع الإلكتروني HealthyChildren.org التابع للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال: تم نقل آلاف الأطفال إلى المستشفى وتوفي المئات بعد الإصابة بكوفيد-19. لا يزال بعض الأطفال الذين تعافوا يعانون من الأعراض المتبقية. في الواقع، من المرجح أن تسبب الإصابة بكوفيد-19 التهاب عضلة القلب أكثر من اللقاح.

س: هل سيغير لقاح الحمض النووي الريبوزي مثل فايزر أو مودرنا الحمض النووي لطفلي؟

ج: لا، في الواقع لا تتفاعل لقاحات الحمض النووي الريبوزي مع حمضك النووي على الإطلاق. بمجرد أن يؤدي لقاح الحمض النووي الريبوزي وظيفته – وهي توجيه جهاز المناعة لديك لحمايتك من كوفيد-19 - يقوم جسمك بتفتيته والقضاء عليه.

س: ما الآثار الجانبية التي يجب أن نكون مستعدين لها؟

ج: شأنها شأن العديد من اللقاحات، يمكن أن تؤدي لقاحات كوفيد-19 إلى آثار جانبية قصيرة المدى. قد لا يعاني بعض الأشخاص من أي آثار جانبية على الإطلاق، بينما قد يعاني الآخرون مما يلي:

- ألم واحمرار وتورم في موقع الحقن
- حمى و/أو قشعريرة
- صداع
- إعياء
- غثبان
- ألم في العضلات

إذا كان طفلك يعاني من هذه الآثار الجانبية، فاتصل على عيادة الأطفال واسأل عن طرق تقليل هذه الأعراض، والتي عادة ما تختفي في غضون يوم أو نحو ذلك. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، من غير المحتمل حدوث آثار جانبية طويلة المدى.

نادرًا ما يكون لدى بعض الأشخاص ردود فعل تحسسية خطيرة تجاه لقاح كوفيد-19. هذا هو سبب أن طفلك سيحتاج إلى الانتظار في العيادة لمدة 15 إلى 30 دقيقة بعد التطعيم. إذا كان طفلك يعاني من رد فعل، فهناك أدوية لعلاج بسرعته.